

Efficacité

Metrolag est un anti-infectieux et antiparasitaire appartenant aux nitroimidazoles. Il inhibe la synthèse des acides nucléiques et est utilisé pour le traitement des infections liées à des bactéries anaérobies ainsi qu'à des protozoaires.

IL est efficace contre, entre autres : les protozoaires *Giardia intestinalis*, *Entamoeba histolytica* et *Trichomonas vaginalis*, les bactéries du genre *Clostridium*, dont *Clostridium difficile* et *Clostridium perfringens*, *Helicobacter pylori* et les bacilles Gram négatif anaérobies, tels les *Bacteroides* (dont *Bacteroides fragilis* (en)), *Prevotella*, *Veillonella* et *Fusobacterium*.

Le métronidazole est utilisé dans le traitement de colites pseudomembraneuses, c'est pourquoi on peut le retrouver associé à d'autres antibiotiques tels que les macrolides apparentés pouvant provoquer ce type de maladie.

Le métronidazole est aussi prescrit pour le traitement des rosacées et des téglangiectasies.

Indications

Parmi les indications principales du Metrolag nous pouvons citer:

- Metrolag, sous forme de comprimés, peut être utilisé en cas d'amibiase (intestinale ou hépatique), d'infections à *Trichomonas* des voies urogénitales, d'infections à *Gardnerella vaginalis* et en cas de lambliaose.
- La solution pour perfusion intraveineuse du Metrolag peut être utilisée en cas de sepsis, de bactériémie, d'abcès cérébral, de pneumonie nécrosante, d'ostéomyélite, de fièvre puerpérale, d'abcès du petit bassin, de paramétrie, de péritonite et d'infections de plaies post-opératoires si des germes anaérobies ont été isolés.
- Metrolag i.v. permet également de prévenir et de traiter des infections post-opératoires dues à des bactéries anaérobies, particulièrement si le germe est un *Bacteroides*.

Posologies

Metrolag comprimés se prend par voie orale à raison de 250 ou 500 mg. Les comprimés ne sont pas sécables.

Metrolag peut être administré à partir de 6 ans en observant la posologie selon le poids de l'enfant. Il doit être capable d'avaler correctement le comprimé.

Gardnerella vaginalis – vaginites (non spécifique)

Deux schémas thérapeutiques sont applicables:

Soit 1,0 à 1,5 g de métronidazole par jour (= 2 à 3 comprimés de 500 mg) durant 5 à 7 jours

Soit 2,0 g de métronidazole (= 4 comprimés de 500 mg) en une prise le premier jour de traitement, suivis d'une seconde dose identique (2,0 g = 4 comprimés de 500 mg) au troisième jour de traitement.

Le même traitement est à conseiller au partenaire.

Infections à *Trichomonas*, urétrites et vaginites à *Trichomonas*

Deux schémas thérapeutiques sont applicables:

Soit thérapie minute (dose unique): prise unique et de préférence le soir de 2 g de métronidazole (= 4 comprimés à 500 mg)

Soit thérapie standard (10 jours): durant 10 jours, matin et soir, prise à chaque fois d'un comprimé à 250 mg de métronidazole.

Afin de prévenir toute réinfection, le partenaire devrait toujours être traité par la même dose orale.

Amibiase

Adultes: 1 comprimé de 500 mg de métronidazole 3 à 4x/jour.

Enfants: 40 mg de métronidazole/kg de poids corporel/jour répartis en 3 à 4 prises.

Les comprimés de 250 mg conviennent aux enfants à partir de 19 kg de poids corporel.

Durée du traitement: lors d'amibiase intestinale ou hépatique aiguë, 7 à 10 jours.

Lambliaose

Cure de cinq jours consécutifs:

Adultes: 1 comprimé à 250 mg de métronidazole 3 fois par jour.

Enfants: 15 mg de métronidazole/kg de poids corporel/jour répartis en 3 prises. Les comprimés de 250 mg conviennent aux enfants à partir de 50 kg de poids corporel.

Solution pour perfusion intraveineuse

L'administration intraveineuse de métronidazole devrait se limiter aux patients pour lesquels une thérapie par voie orale n'est pas possible. Il faut substituer aussi rapidement que possible à la thérapie par perfusion intraveineuse une thérapie par voie orale. Metrolag i.v. est une solution pour perfusion prête à l'emploi. Metrolag peut être administré seul ou en même temps (toutefois sans mélanger) que d'autres chimiothérapies antibactériennes si celles-ci sont indiquées.

Prophylaxie des infections post-opératoires à anaérobies.

Contre-Indications

Grossesse, allaitement, alcoolisme, insuffisance rénale et insuffisance hépatique (sous contrôle strict). Hypersensibilité à l'égard des dérivés de l'imidazole.

Effets secondaires (les plus fréquents)

Maux de tête, vertiges, nausées, vomissements, diarrhée, troubles du goût, anorexie, prurit.


Emballages sur le marché

Metrolag comprimés

250 mg 20 comprimés

500 mg 8 comprimés

500 mg 24 comprimés



Metrolag i.v.

Poche de 100 ml 5 mg/ml 10 et 20 poches