

DCI doxycycline hyclate

Efficacité

Doxylag est un antibiotique de la famille des cyclines. Doxylag est un antibiotique sûr faisant partie des médicaments essentiels de l'OMS. Son spectre large permet son utilisation aussi bien en tant ue prophylaxie que de traitement.

Indications

Parmi les indications principales du Doxylag nous pouvons citer:

- la syphilis (tréponème) ;
- les chlamydioses ;
- l'acné inflammatoire ;
- la maladie du charbon (*Bacillus anthracis*) ;
- le choléra (*Vibrio cholerae*) ;
- la peste (*Yersinia pestis*) ;
- la maladie de Lyme (Borrélioses) ;
- la fièvre Q (*Coxiella burnetii*) ;
- la brucellose ;
- les infections à Mollicutes (*Mycoplasma* et *Ureaplasma* surtout) ;
- les gonococcies ;
- la pasteurellose ;
- les rickettsioses ;
- les infections à *Haemophilus influenzae* ;
- la tularémie.
- La prophylaxie du paludisme ainsi que de la maladie de Lyme peuvent être dans certains cas du ressort de la doxycycline.

Posologies

Il est recommandé de prendre la doxycycline au cours du repas du soir, au moins une heure avant de dormir, avec beaucoup d'eau et en position assise, car les comprimés restent facilement bloqués dans l'œsophage où ils peuvent provoquer des ulcères (généralement bénins mais douloureux).

Dose habituelle (infections thoraciques, pulmonaires ou nasales, des voies urinaires, oculaires et autres) : 200 mg le premier jour, puis 100 mg par jour. La durée du traitement dépend de l'infection traitée.

Enfants âgés de 8 ans à moins de 12 ans : La doxycycline pour le traitement des infections aiguës chez les enfants âgés de 8 ans à moins de 12 ans doit être utilisée dans les situations où d'autres médicaments ne sont pas disponibles ou ne sont pas susceptibles d'être efficaces. Dans de telles circonstances, les doses habituelles sont les suivantes :

Pour les enfants de 45 kg ou moins : Premier jour : 4,4 mg par kg de poids corporel (en une ou deux doses fractionnées), puis 2,2 mg par kg de poids corporel (en une ou deux doses fractionnées) à partir du deuxième jour. La durée du traitement dépend de l'infection à traiter.

Dans les infections plus sévères, il convient d'administrer jusqu'à 4,4 mg par kg de poids corporel pendant toute la durée du traitement. Pour les enfants de plus de 45 kg : il convient d'utiliser la dose administrée pour les adultes ; 200 mg le premier jour, puis 100 mg par jour. La durée du traitement dépend de l'infection traitée.

Adultes et enfants âgés de 12 à moins de 18 ans : 200 mg le premier jour, puis 100 mg par jour. La durée du traitement dépend de l'infection traitée.

Acné : 50 mg par jour avec des aliments ou des boissons pendant 6 à 12 semaines (votre médecin vous conseillera un autre produit à base de doxycycline avec la posologie correspondante).

Maladie sexuellement transmissible : 100 mg deux fois par jour pendant 7-10 jours Syphilis primaire et secondaire : 200 mg deux fois par jour pendant 2 semaines.

Votre médecin continuera à vous surveiller après l'arrêt du traitement.

Fièvres associées aux piqûres de poux ou de tiques : dose unique de 100 à 200 mg en fonction de la gravité.

Traitement du paludisme, lorsque la chloroquine n'est pas efficace : 200 mg par jour pendant au moins 7 jours.

Prévention du paludisme : 100 mg par jour 1 à 2 jours avant un voyage dans une zone impaludée et jusqu'à 4 semaines après le retour.

Prévention du typhus des broussailles : dose unique de 200 mg.

Prévention de la diarrhée du voyageur : 100 mg deux fois par jour le premier jour du voyage, puis 100 mg par jour pendant toute la durée du séjour dans la région. Si vous prévoyez de prendre ces gélules pendant plus de 21 jours, veuillez consulter votre médecin.

Prévention de la leptospirose : 200 mg une fois par semaine pendant le séjour dans la région ; 200 mg à la fin du voyage. Si vous prévoyez de prendre ces gélules pendant plus de 21 jours, veuillez consulter votre médecin. Vous devriez commencer à vous sentir mieux après quelques jours.

Si vous avez reçu des gélules de Doxylag pour l'acné, il peut s'écouler quelques semaines avant que vous ne constatiez une amélioration. Si votre infection s'aggrave ou si vous ne vous sentez pas mieux au bout de quelques jours (sauf pour l'acné), ou si une nouvelle infection se développe, retournez voir votre médecin.

Traitement de la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses : Adultes : 100 mg toutes les 12 heures ; 100 mg toutes les 12 heures. Enfants : pesant moins de 45 kg : 2,2 mg/kg de poids corporel administrés deux fois par jour. Les enfants pesant 45 kg ou plus doivent recevoir la dose adulte. Les patients doivent être traités pendant au moins 3 jours après la disparition de la fièvre et jusqu'à ce qu'une amélioration clinique soit constatée. La durée minimale du traitement est de 5 à 7 jours.

Contre-Indications

Grossesse, allaitement, alcoolisme, insuffisance rénale et insuffisance hépatique (sous contrôle strict). Hypersensibilité à l'égard des dérivés de la tétracycline

Effets secondaires (les plus fréquents)

Maux de tête, maux d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, troubles du goût, sang dans les selles, prurit, hypersensibilité de la peau à la lumière - photosensibilité (taches persistantes), manque d'appétit. Gonflement des ganglions. Difficultés respiratoires.

Emballages sur le marché

Doxylag 100 mg gélule

10, 50, 100 gélules par emballage

